


Meus 5 Momentos para Higiene das Mãos

Foco no cuidado do paciente com cateter venoso periférico

Imediatamente antes de quaisquer tipos de manipulação do cateter e do sistema de administração de medicamento intravenoso, tais como:

- 2a.** Inserir ou retirar cateter (antes de calçar luvas não estéreis), trocar curativo, coletar sangue e antes de preparar materiais ou equipamentos relacionados a estes procedimentos;
- 2b.** Acessar (abrir) o sistema de administração/ infusão;
- 2c.** Preparar medicação para infusão pelo cateter.



Imediatamente após quaisquer tarefas que possam envolver uma exposição potencial a fluidos corporais, tais como:

- 3a.** Inserir ou remover o cateter;
- 3b.** Coletar sangue do cateter.

Considerações adicionais fundamentais para Cateteres Venosos Periféricos

- 1. Indicação:** Assegurar que o uso do cateter venoso periférico tenha indicação clínica. Remover o cateter assim que não houver mais indicação clínica.
- 2. Inserção/manutenção/remoção:**
 - 2.1. Preparar a pele aplicando antisséptico (álcool 70%, iodopovidona – PVPI alcoólico 10% ou gluconato de clorexidina 0,5% a 2%) antes de inserir o cateter;
 - 2.2. Calçar luvas não estéreis para inserir, remover e coletar sangue do cateter, com técnica asséptica;
 - 2.3. Substituir a cobertura tipo gaze a cada dois dias e a película transparente a cada 7 dias; trocar a cobertura sempre que visivelmente suja;
 - 2.4. Considerar a troca de cateter a cada 96h;
 - 2.5. Considerar a troca do equipo para administração de sangue e hemoderivados, quimioterapia e emulsões lipídicas dentro de 24 horas após o início da infusão. Considere a troca de todos os outros equipos a cada 96 horas.
- 3. Monitoramento:** Registrar a data e o horário de inserção e remoção do cateter, bem como da troca de curativo; verificar diariamente a condição (aspecto visual) do sítio de inserção do cateter.